Biopsia de próstata por microultrasonidos

Biopsia dirigida a las zonas sospechosas con ecografía de alta resolución

DURACIÓN	ANESTESIA	ANTIBIÓTICO	RESULTADO
20 a 30 minutos	**local**	**según la vía de la biopsia**	**en 1 o 2 semanas**

¿Para qué sirve?

La biopsia es la única forma de confirmar si hay un cáncer de próstata. Con los microultrasonidos vemos la próstata con más detalle y podemos **dirigir la aguja a las zonas sospechosas**, en lugar de tomar muestras al azar. Así se detectan mejor los tumores que importan y se evitan muestras innecesarias.

¿Cómo se hace?

Con anestesia local, y guiados por la imagen de microultrasonidos, tomamos pequeñas muestras de la próstata con una aguja fina. Primero de las zonas sospechosas y después, si hace falta, de otras zonas. Las muestras se envían a analizar.

Según su caso, la aguja entra por el periné (la piel entre el escroto y el ano) o por el recto. Le explicaremos qué vía usaremos en su caso.

Antes de la prueba

- Si toma **anticoagulantes o antiagregantes** (por ejemplo Sintrom, apixabán, rivaroxabán, clopidogrel o aspirina), díganoslo antes de la prueba: puede que haya que suspenderlos unos días. No los deje por su cuenta.
- Le indicaremos si tiene que tomar antibiótico o ponerse un enema antes.
- Haga un análisis de orina si se lo hemos pedido. Avísenos si tiene fiebre o escozor al orinar.
- Venga acompañado si es posible.

Después de la prueba

- Es normal ver sangre en la orina o en las heces unos días, y en el semen hasta varias semanas. No es preocupante.
- Beba abundante líquido y evite esfuerzos y montar en bicicleta durante 2 o 3 días.
- Le daremos cita para explicarle el resultado.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Riesgos

- Sangre en la orina, las heces o el semen (frecuente y pasajera).
- Infección de orina o de la próstata. Es poco frecuente, pero puede ser seria si hay fiebre.
- Dificultad para orinar (retención), poco frecuente.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- **Fiebre de más de 38 °C o escalofríos**: acuda a urgencias sin esperar.
- Sangre abundante o con coágulos en la orina.
- No puede orinar.

Esta hoja resume la información general sobre la prueba. No sustituye la explicación de su urólogo. Si tiene cualquier duda, pregúntenos antes de la prueba.