Circuncisión y frenuloplastia

Cirugía de la fimosis y del frenillo corto en el adulto

DURACIÓN	ANESTESIA	INGRESO	CURACIÓN
30 a 45 minutos	local o sedación	no hace falta	3 a 4 semanas

¿Para qué sirve?

Para la **fimosis** (el prepucio no baja), las infecciones repetidas del glande y el prepucio, y el **frenillo corto** que tira o se rompe en la erección.

¿En qué consiste?

Circuncisión: con anestesia, se retira el prepucio que cubre el glande y se cose el borde con puntos reabsorbibles, que se caen solos.



Frenuloplastia: si el problema es solo un frenillo corto, se alarga con un pequeño corte a lo ancho que se cose a lo largo, sin quitar el prepucio.



¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Circuncisión con pistola automática

En Urología Clínica contamos también con una forma rápida y sencilla de hacer la circuncisión: con sutura mecánica mediante la pistola de circuncisión automática Circurer. En un solo paso corta el prepucio y cierra el borde con grapas, con un buen resultado estético.



Esta técnica tiene un precio aparte. Pregunte a nuestro personal y le daremos un presupuesto.

Después de la cirugía (con cualquiera de las tres técnicas)

- Se va a casa el mismo día.
- Lave la zona con agua y jabón suave a diario y séquela bien.
- Es normal la hinchazón y algún hematoma las primeras semanas.
- Evite las relaciones sexuales y la masturbación durante 4 semanas.
- Los puntos se caen solos en 2 a 4 semanas.

Riesgos

- Sangrado o hematoma.
- Infección de la herida.
- Resultado estético irregular, poco frecuente.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al 944 393 510 o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Sangrado que no para al presionar 10 minutos.
- Fiebre de más de 38 °C.
- No puede orinar.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz