Cistoscopia

Ver el interior de la uretra y la vejiga con una cámara fina

DURACIÓN	ANESTESIA	AYUNO	DESPUÉS
5 a 10 minutos	**gel anestésico local**	**no hace falta**	**vida normal el mismo día**

¿Para qué sirve?

Permite ver directamente por dentro la uretra y la vejiga. La indicamos, entre otros casos, para:

- Estudiar la sangre en la orina.
- Revisar la vejiga en pacientes que han tenido un tumor de vejiga.
- Buscar la causa de infecciones de orina repetidas, molestias al orinar o una estrechez de la uretra.
- Retirar un catéter doble J que se dejó tras una operación.

¿Cómo se hace?

Se hace en la consulta, tumbado en una camilla. Primero limpiamos la zona y ponemos un **gel anestésico** en la uretra. Después introducimos un **cistoscopio flexible**, un tubo fino y blando con una cámara en la punta, y llenamos la vejiga con suero para verla bien.

Puede sentir ganas de orinar y alguna molestia leve al paso del cistoscopio. Usted puede ver la imagen en la pantalla y le explicaremos lo que vemos.

Antes de la prueba

- No necesita estar en ayunas. Puede tomar su medicación habitual.
- Avísenos si tiene fiebre, escozor al orinar o una infección de orina: en ese caso conviene aplazar la prueba.
- Si le hemos pedido un análisis de orina previo, tráigalo hecho.

Después de la prueba

- Puede irse a casa y hacer vida normal, también conducir.
- Es normal notar escozor al orinar y ver la orina algo rosada durante uno o dos días.
- Beba abundante líquido ese día.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Riesgos

Es una prueba segura. Lo más frecuente son molestias leves al orinar. Es poco frecuente tener una **infección de orina** después.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C o escalofríos.
- Sangre abundante en la orina o con coágulos, que no mejora al beber líquido.
- No puede orinar o tiene un dolor intenso en la parte baja del abdomen.

Esta hoja resume la información general sobre la prueba. No sustituye la explicación de su urólogo. Si tiene cualquier duda, pregúntenos antes de la prueba.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz