Litotricia extracorpórea (LEOC)

Romper las piedras con ondas de choque desde fuera del cuerpo, sin cirugía

DURACIÓN	ANESTESIA	INGRESO	SESIONES
45 a 60 minutos	calmantes o sedación	no hace falta	a veces más de una

¿Para qué sirve?

Para piedras del riñón o del uréter de tamaño pequeño o mediano, normalmente de menos de 2 cm, según su dureza y su localización.

¿En qué consiste?

Se tumba en una camilla y un aparato envía **ondas de choque** desde fuera, guiadas con rayos X o ecografía, hasta la piedra. Las ondas la rompen en fragmentos pequeños que después expulsa con la orina en los días o semanas siguientes. **No hay cortes ni se introduce nada.**



Antes

- Díganos si toma anticoagulantes o antiagregantes: suele haber que suspenderlos.
- Análisis de orina para descartar infección.
- Si está embarazada o puede estarlo, no se puede hacer.
- Venga acompañado: no podrá conducir ese día.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Después

- Beba abundante agua para ayudar a expulsar los fragmentos.
- Es normal ver la orina rosada y notar molestias tipo cólico unos días.
- Orine en un colador para recoger los fragmentos y tráigalos para analizarlos.
- Haremos una prueba de imagen para comprobar el resultado. A veces hace falta otra sesión.

Riesgos

- Cólico al expulsar los fragmentos.
- Hematoma en el riñón, poco frecuente.
- Infección de orina.
- Que la piedra no se rompa del todo y haga falta otro tratamiento.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C o escalofríos.
- Sangre abundante en la orina o con coágulos, que no mejora al beber líquido.
- No puede orinar o tiene un dolor intenso que no cede con los calmantes.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.