Nefrolitotomía percutánea (NLP)

Quitar las piedras grandes del riñón a través de un pequeño orificio

PARA	ANESTESIA	INGRESO	HERIDA
piedras de más de 2 cm	**general**	**1 a 3 noches**	**1 cm en el costado**

¿Para qué sirve?

Para piedras grandes del riñón, de más de 2 cm, o complejas (coraliformes), que no se pueden tratar bien con litotricia o ureteroscopia.

¿En qué consiste?

Con anestesia general y guiados por ecografía y rayos X, hacemos un pequeño orificio de alrededor de 1 cm en el costado hasta el riñón. Por él introducimos un endoscopio, rompemos la piedra y sacamos los fragmentos. Hacemos esta cirugía con el paciente boca arriba y, cuando conviene, combinada con un endoscopio flexible por la uretra (técnica ECIRS).

Después

- Ingreso de 1 a 3 noches.
- Puede llevar un drenaje en el costado o un catéter doble J unos días.
- Evite esfuerzos y cargar peso durante 2 a 4 semanas.
- Haremos una prueba de imagen para comprobar que no quedan fragmentos.

Riesgos

- **Sangrado:** es el riesgo más importante. Rara vez requiere transfusión o una embolización.
- Infección y fiebre.
- Lesión de órganos vecinos, muy poco frecuente.
- Que queden fragmentos.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C o escalofríos.
- Sangre abundante en la orina o con coágulos, que no mejora al beber líquido.
- No puede orinar o tiene un dolor intenso que no cede con los calmantes.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz