Neuromodulación sacra

Un pequeño estimulador que regula los nervios que controlan la vejiga

FASES	ANESTESIA	INGRESO	REVERSIBLE
prueba y definitiva	**local o sedación**	**corto o ambulatorio**	**se puede apagar o retirar**

¿Para qué sirve?

Para la **vejiga hiperactiva** con urgencia y escapes, la **retención de orina** sin obstrucción (la vejiga no se vacía) y, en algunos casos, la incontinencia fecal, cuando otros tratamientos no han funcionado.

¿En qué consiste?

Un electrodo fino colocado junto a los nervios sacros, en la parte baja de la espalda, envía impulsos eléctricos suaves que ayudan a que la vejiga y el cerebro vuelvan a coordinarse. Se hace en dos fases:

1. **Fase de prueba:** colocamos el electrodo y lo conectamos a un estimulador externo durante 1 o 2 semanas. Usted anota en un diario cómo orina.
2. **Implante definitivo:** si los síntomas mejoran al menos a la mitad, colocamos bajo la piel de la nalga un pequeño generador, parecido a un marcapasos.

Después

- Durante unas semanas evite los esfuerzos y los movimientos bruscos de la espalda, para que el electrodo no se mueva.
- Le enseñaremos a usar el mando para ajustar o apagar la estimulación.
- Avise de que lo lleva antes de una resonancia o de otras intervenciones.

Riesgos

- Dolor o molestias en la zona del generador.
- Infección de la herida.
- Desplazamiento del electrodo, que puede necesitar recolocarlo.
- Pérdida de eficacia con el tiempo.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C.
- Enrojecimiento, calor o supuración en la herida.
- Dolor intenso o calambres molestos con la estimulación.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.