Prótesis de pene

Para la disfunción eréctil que no mejora con otros tratamientos

INGRESO	ANESTESIA	USO	RESULTADO
1 noche	general o raquídea	a las 4-6 semanas	erección cuando la necesite

¿Para qué sirve?

Para conseguir erecciones cuando las pastillas, las inyecciones y otros tratamientos no funcionan o no se toleran. También se usa en la enfermedad de Peyronie con disfunción eréctil.

¿En qué consiste?

Colocamos dentro de los cuerpos cavernosos del pene unos cilindros. Hay dos tipos:

- **Hidráulica (inflable):** los cilindros se llenan de líquido desde un depósito en el abdomen al pulsar una pequeña bomba en el escroto. La erección es natural y el pene queda flácido en reposo.
- **Maleable:** cilindros flexibles que se colocan hacia arriba o hacia abajo con la mano. Es más sencilla.

La prótesis queda totalmente dentro del cuerpo y no se ve. No cambia la sensibilidad, el orgasmo ni la eyaculación.

Después

- Ingreso de 1 noche.
- Molestias las primeras 2 o 3 semanas, que se controlan con calmantes.
- Le enseñaremos a usarla en la consulta. Podrá tener relaciones a las 4 a 6 semanas.

Riesgos

- **Infección:** es poco frecuente, pero puede obligar a retirar la prótesis.
- Fallo mecánico con los años, que puede requerir cambiarla.
- El pene en erección puede ser algo más corto que antes de la disfunción.
- Una vez colocada, no se recuperan las erecciones naturales.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Véalo en la web

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C.
- Enrojecimiento, hinchazón o supuración en la herida o el escroto.
- Dolor que aumenta en lugar de disminuir.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.