Test de erección con prostaglandina

Inyección intracavernosa para estudiar y tratar la disfunción eréctil

DURACIÓN	PINCHAZO	AYUNO	IMPORTANTE
20 a 30 minutos	**aguja muy fina**	**no hace falta**	**una erección de más de 4 h es una urgencia**

¿Para qué sirve?

Se inyecta en el pene un medicamento, la **prostaglandina E1 (alprostadil)**, que relaja los vasos y provoca una erección sin necesidad de estímulo. Lo usamos para:

- **Diagnóstico:** saber si los vasos del pene responden bien. A veces lo combinamos con una ecografía doppler.
- **Tratamiento:** cuando las pastillas no funcionan, le enseñamos a ponerse la inyección en casa antes de la relación sexual.
- Valorar la curvatura del pene en la enfermedad de Peyronie.

¿Cómo se hace?

En la consulta, con una aguja muy fina, inyectamos el medicamento en un lateral del pene. El pinchazo es breve y poco doloroso. La erección aparece en unos 10 a 15 minutos y valoramos su calidad y duración.

Si es para tratamiento, le enseñamos paso a paso a ponerse la inyección usted mismo, y ajustamos la dosis.

Antes de la prueba

- No necesita estar en ayunas.
- No tome pastillas para la erección (sildenafilo, tadalafilo...) el día de la prueba.
- Díganos si toma anticoagulantes o si ha tenido alguna vez una erección prolongada.

Después de la prueba

- La erección debe desaparecer sola en 1 o 2 horas. Antes de irse comprobaremos que va bajando.
- Puede notar algo de molestia o un pequeño hematoma en la zona del pinchazo.
- Si se la pone en casa: no repita la dosis el mismo día y no la use más de 2 o 3 veces por semana.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Riesgos

- Dolor leve en el pene.
- Hematoma en la zona del pinchazo.
- **Erección prolongada (priapismo):** es poco frecuente, pero es una urgencia. Si dura más de 4 horas, necesita tratamiento para no dañar el pene.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- **Una erección que dura más de 4 horas**: acuda a urgencias sin esperar.
- Dolor intenso o un hematoma grande en el pene.

Esta hoja resume la información general sobre la prueba. No sustituye la explicación de su urólogo. Si tiene cualquier duda, pregúntenos antes de la prueba.