Toxina botulínica en la vejiga

Para la vejiga hiperactiva y la vejiga neurógena que no mejoran con otros tratamientos

DURACIÓN	ANESTESIA	INGRESO	EFECTO
15 a 20 minutos	local o sedación	no hace falta	dura de 6 a 12 meses

¿Para qué sirve?

La toxina botulínica relaja el músculo de la vejiga (detrusor) y reduce las contracciones que producen la urgencia y los escapes. La usamos en la **vejiga hiperactiva** que no mejora con medicamentos o estimulación del nervio tibial, y en la **vejiga neurógena** (por lesión medular, esclerosis múltiple u otras enfermedades neurológicas).

¿En qué consiste?

Por la uretra introducimos un cistoscopio, un tubo fino con cámara, y con una aguja muy fina inyectamos la toxina en varios puntos de la pared de la vejiga. **No hay cortes en la piel.** El efecto empieza a notarse en 1 o 2 semanas.



Antes del tratamiento

- Haremos un análisis de orina: si hay infección, hay que tratarla antes.
- Díganos si toma anticoagulantes o antiagregantes.
- Le daremos antibiótico para prevenir infecciones.

¿Tiene dudas? Estamos para ayudarle
Cita **944 393 510** · WhatsApp **688 873 045** · gestion@urologiaclinica.biz
Urología Clínica · Hospital Universitario IMQ Zorrotzaurre
Ballets Olaeta 4, 3.ª planta · 48014 Bilbao · urologiaclinica.biz

Después

- Puede irse a casa el mismo día.
- Es normal notar escozor y algo de sangre en la orina 1 o 2 días.
- Le revisaremos a las pocas semanas para comprobar que vacía bien la vejiga.
- El efecto dura de 6 a 12 meses. Cuando pasa, se puede repetir.

Riesgos

- **Infección de orina.**
- **Dificultad para vaciar la vejiga.** En algunos pacientes la vejiga queda demasiado relajada y hay que vaciarla con una sonda fina (autosondaje) durante unas semanas. Le enseñaremos a hacerlo antes del tratamiento.

Cuándo debe llamarnos

Llámenos al **944 393 510** o acuda a urgencias del hospital si tiene:

- Fiebre de más de 38 °C o escalofríos.
- Sangre abundante en la orina o con coágulos, que no mejora al beber líquido.
- No puede orinar o tiene un dolor intenso que no cede con los calmantes.

Esta hoja resume la información general sobre el tratamiento. No sustituye la explicación de su urólogo ni el consentimiento informado, que le entregaremos antes de la intervención.